

Colopten

A07FA

frazioni antigeniche purificate

ELEMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE

COLOPTEN frazioni antigeniche purificate

COMPOSIZIONE

Una fiala contiene:

Principio attivo: Frazioni antigeniche purificate estratte da:

Staphylococcus aureus ceppi 634, 636, 659 ana 2 mg pari a 10^9 batteri

Escherichia coli ceppi 1539, 418, 430, 492 ana 2 mg pari a 10^9 batteri

Aerobacter aerogenes ceppi 809, 811, 812 ana 2 mg pari a 10^9 batteri

Proteus vulgaris ceppi 1557, 1561, 1565 ana 2 mg pari a 10^9 batteri

Eccipienti: Aroma idrosolubile di lampone, Acqua distillata q.b. a 5 ml.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Fiale da 5 ml per uso orale - Astuccio da 20 fiale

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Il **COLOPTEN** è costituito da frazioni antigeniche purificate, estratte da diversi ceppi di Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes e Proteus vulgaris.

Il **COLOPTEN** consente pertanto di realizzare un trattamento efficace ed assolutamente atossico delle diarree e delle turbe intestinali da dismicrobismo, particolarmente se dipendente da terapie antimicrobiche (antibiotici e chemioterapici antibatterici).

TITOLARE A.I.C.

Laboratoires DEBAT - 153, Rue de Buzenval - 92380 Garches (Francia)

RAPPRESENTANTE DI VENDITA PER L'ITALIA

FOURNIER PHARMA S.p.A.

Centro Direzionale Milano Oltre - Palazzo Caravaggio - Via Cassanese 224,
20090 Segrate (MI)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

Boehringer Ingelheim France Z.I. - Le Fossé de l'Etang, Estrees Saint Denis - France

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento delle diarree infettive e delle gastro-enteriti del lattante e del bambino; cura e profilassi dei disturbi intestinali indotti da antibiotici; profilassi delle diarree del lattante in collettività ed in corso di epidemia.

INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DELL'USO DEL MEDICINALE

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.

PRECAUZIONI PER L'USO

Non ve ne sono.

INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E ALTRE FORME DI INTERAZIONE

Non ne sono segnalate.

AVVERTENZE SPECIALI

In corso di terapia antimicrobica COLOPTEN va assunto negli intervalli tra le somministrazioni del chemioterapico.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

ISTRUZIONI NECESSARIE E CONSUETE PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Da 1 a 3 fiale per uso orale al giorno o più, secondo l'età ed in conformità alla prescrizione medica.

Lattanti e bambini: 1 fiala per via orale al giorno fino ad un mese di età; 2 fiale per via orale al giorno da un mese ad un anno di età; 3 fiale per via orale al giorno oltre un anno di età.

SOVRADOSAGGIO

Non sono stati segnalati fenomeni da sovradosaggio.

EFFETTI INDESIDERATI

Non ne sono segnalati.

Il paziente è invitato a comunicare al proprio medico curante o al proprio farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglietto illustrativo.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Per la data ultima di utilizzo si rimanda alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

ULTIMA REVISIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE:

Giugno 2000.

Rappresentante di vendita per l'Italia:

FOURNIER PHARMA S.p.a. - SEGRATE (MI)